

Reconstruyendo la personalidad

CIRUGIA DE LAS OREJAS

Cirugías Faciales Reparadoras

- Malformaciones congénitas y maxilofaciales
- Heridas faciales
- Déficit visual, ventilatorio nasal o de motilidad labial
- Cobertura cutánea post cirugía oncológica

Cirugías Faciales Estéticas

- Blefaroplastia superior y/o inferior
- Rinoplastia
- Mentoplastia
- Otoplastia, cirugía en orejas aladas
- Lifting frontal
- Minilifting facial y cervical
- Lifting total



Dr. Christian Salem Z
Cirujano Plástico

Definición

Si bien las orejas pasan más bien desapercibidas a una simple mirada, una malformación congénita o traumática puede marcar la personalidad de un menor, ante las críticas inocentes de sus pares.

En etapas posteriores de la vida, como en la adolescencia o en la juventud, se torna más importante la autocrítica, donde estas alteraciones físicas pueden afectar el propio ego y así, la relación con su entorno social.



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4

En las imágenes se dan a conocer los diferentes procedimientos para realizar la técnica quirúrgica de corrección de orejas aladas, en asa u "orejas de dumbo". En la primera figura se puede observar la marcación del exceso de piel retroauricular a resecar, en la figura 2 la resección del exceso de cartilago auricular. En tanto, en la figura 3 se aprecia la marcación de los puntos de fijación que se dará a la oreja para situarla en su posición ideal. Luego, en la figura 4 se muestra el cierre final de la herida, dejando una cicatriz muy poco perceptible en el surco retroauricular.



ANTES

DESPUES

Indicaciones para una cirugía auricular

- | Estética | Reconstructiva |
|-------------------------------|------------------------------|
| • Orejas aladas (de "dumbo"). | • Desgarro Lóbulo (aros). |
| • Orejas grandes. | • Heridas o mordeduras. |
| • Lóbulo ptosado (senil). | • Malformaciones congénitas. |
| • Asimetría auricular. | • Secuelas de quemaduras. |

Finalmente, la cirugía auricular requiere toda la imaginación y arte del equipo quirúrgico, siendo cada caso diferente y un constante desafío para el Cirujano Plástico, que con este resultado espera no sólo reconstruir la oreja malformada, sino que también influenciar positivamente en la personalidad y seguridad del paciente.

La cirugía auricular Las cirugías de las orejas están ya descritas desde el siglo XVI, han sido y siguen siendo un desafío constante para el cirujano plástico, debido a diversidad de defectos que estas pueden presentar y a las innumerables técnicas reconstructivas o estéticas a utilizar.

Las malformaciones auriculares son en su mayoría un defecto estético, con repercusiones psicológicas importantes, comprometiendo en algunos casos la función auditiva por ausencia del conducto auditivo externo, que comunica el oído con el exterior. Por lo tanto, los beneficios de una cirugía auricular pasan por los ámbitos estéticos, reconstructivo y fuertemente en el área emocional.

Técnicas quirúrgicas Dada la multiplicidad de cirugías y las muchas técnicas existentes para ellas, resulta complejo resumirlas en pocas líneas. En términos generales, las cirugías estéticas auriculares son de carácter ambulatorio, pudiendo ser realizadas con anestesia local o general y habitualmente requieren de sólo un tiempo quirúrgico. Por otra parte, las cirugías reconstructivas presentan dos situaciones: en el caso de desgarros o heridas, son muy similares a las cirugías estéticas, es decir, ambulatorias y de un tiempo quirúrgico; mientras que las cirugías reconstructivas más complejas, como malformaciones congénitas o secuelas de quemaduras, necesitan hospitalización más prolongada y múltiples intervenciones en varios tiempos quirúrgicos.

Tipos de anestesia

Habitualmente se usa anestesia local, que puede ser completamente con sedación. La persona estará tranquila y relajada; la zona operatoria se encontrará completamente insensible. En niños menores de ocho años, muchas veces se hace necesario el empleo de anestesia general. A estas edades no se puede conseguir las condiciones de tranquilidad necesarias para efectuar la cirugía con anestesia local.

Riesgos y complicaciones

Esta cirugía tiene riesgos comunes a la de otros procedimientos quirúrgicos. El daño o sufrimiento de la piel por la operación es extraordinariamente infrecuente. Pueden surgir complicaciones menos graves y alejadas del momento de la cirugía. Una es la cicatrización hipertrófica a nivel de las incisiones. De ocurrir esto, puede ser necesario el uso de sustancias antiinflamatorias a nivel de la cicatriz. Es posible que aparezca algún grado de asimetría al comparar ambas orejas. Asimetrías mínimas son tolerables y es normal en órganos de representación bilateral. Defectos mayores pueden hacer necesario una revisión parcial de la cirugía original.

Período Post-Operatorio

El dolor en este período es fácilmente tratable con los analgésicos indicados por el especialista. Este dolor es de menor intensidad en los niños. El período de incomodidad dura menos de una semana después de la operación. En esa oportunidad se puede retirar los puntos. En el caso de niños menores en general se usa puntos absorbibles, para evitarles este procedimiento en las curaciones. Después de esta primera curación, el aspecto de las orejas es cercano a lo normal. Aún hay edema y enrojecimiento de la piel, que irá desapareciendo en los días posteriores. La piel de los pabellones auriculares tendrá su sensibilidad alterada durante algún tiempo. Las orejas quedan protegidas durante otras dos semanas durante el día mediante el uso de cintillo. En la noche para dormir, el cintillo se debe usar durante cinco semanas. En cuanto a las actividades, la persona operada puede levantarse desde el día siguiente al de la cirugía y sólo está restringida para realizar actividades físicas pesadas, gimnasia o deportes. La plena actividad física se puede hacer desde la tercera o cuarta semana de realizada la corrección quirúrgica.

Antes del mes, el pabellón auricular adquiere prácticamente su aspecto estético definitivo. Se ve como una oreja normal que nunca ha sido operada. En este período aún puede existir algún grado de insensibilidad en la piel, que se recupera en las semanas y meses siguientes. En muy pocos casos, alteraciones mínimas en la sensibilidad de la piel pueden ser permanentes. Los pacientes quedan tan satisfechos que rápidamente modifican el largo del cabello o estilo de peinado. Es así como los hombres se cortan el pelo y las mujeres usan peinados que exponen completamente las orejas.

DR. CHRISTIAN SALEM ZAMORANO

Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo

Universidad de Chile

Pontificia Universidad Católica, Sao Paulo - Brazil

Fellow, Centro de Estudios Prof. Ivo Pitanguy

Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

Miembro Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica

Miembro Sociedad Brasileña Medicina Estética

R.U.T.: 7.627.650 - 1



QUIRUPLAST
CIRUGIA PLASTICA & MEDICINA ESTETICA

Fono: Santiago 02 - 22330669 | C. Médico Los Torreones Valdivia 063 - 2239257 | Megasalud Osorno 064 - 2269550 | Megasalud P.Montt 065 - 2286140 | Clínica Magallanes Punta Arenas 061 - 2207200 contacto@quiruplast.cl